

Stades cliniques et critères de détermination de l'OMS pour entamer le traitement ARV

	Stade clinique 1 de l'OMS : asymptomatique	Stade clinique 2 de l'OMS : maladie légère	Stade clinique 3 de l'OMS : maladie modérée	Stade clinique 4 de l'OMS : Maladie grave (SIDA)
Poids	Pas de perte de poids	Perte de poids 5-10 %	Perte de poids > 10 %	Syndrome cachectique lié au VIH
Symptômes	<ul style="list-style-type: none"> • aucun • ou lymphadénopathie persistante, généralisée 	<ul style="list-style-type: none"> • lésions ou gerçures autour des lèvres • exanthème • varicelle-zona dans les 5 dernières années • infections récurrentes des voies respiratoires supérieures • ulcères buccaux 	<ul style="list-style-type: none"> • muguet • diarrhée, candidose vaginale ou fièvre inexpliquée pendant plus d'un mois • infections bactériennes graves (par exemple, pneumonie) • tuberculose pulmonaire dans l'année écoulée 	<ul style="list-style-type: none"> • muguet œsophagique • ulcérations d'herpès simplex pendant plus d'un mois • lymphome • sarcome de Kaposi • cancer du col utérin invasif • pneumonie à pneumocystis • tuberculose extrapulmonaire • méningite à cryptocoque • encéphalopathie VIH
Critères de démarrage du traitement ARV	<ul style="list-style-type: none"> • seulement si numération CD4 <200 	<ul style="list-style-type: none"> • seulement si numération CD4 <200 ou nombre total de lymphocytes <1200/mm³ 	<ul style="list-style-type: none"> • si numération CD4 indisponible, traiter tous les patients au stade 3 • si numération CD4 est disponible et <350, entamer traitement 	<ul style="list-style-type: none"> • tous les patients au stade 4 répondent aux conditions médicales pour entamer le traitement